

Die sanfte Kraft von *Plantago ovata*



Mucofalk®

Natürliche Kraft für gute Verdauung

- Reguliert die Darmfunktion bei Verstopfung und Durchfall
- Erleichtert den Stuhlgang bei proktologischen Beschwerden z. B. Hämorrhoiden

Mucofalk® Apfel/Orange/Fit. Wirkstoff: Indische Flohsamenschalen (*Plantago ovata* Samenschalen, gemahlen). **Zusammensetzung:** 5 g Granulat (1 Beutel bzw. 1 gestr. ML) enthalten: Arzn. wirks. Bestandteile: 3,25 g Indische Flohsamenschalen, gemahlen. Sonst. Bestandteile: Sucrose (Saccharose), Citronensäure, Dextrin (aus Mais oder Kartoffeln), Natriumalginat, Natriumcitrat (Ph.Eur.), Apfel- bzw. Orangen-Aroma, Natriumchlorid, Saccharin-Natrium. **Anwendungsgebiete:** Chronische Obstipation. Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darmentleerung mit weichem Stuhl angestrebt wird, z. B. bei schmerzhafter Stuhlentleerung nach operativen Eingriffen im Enddarmbereich, bei Analfissuren, Hämorrhoiden. Unterstützende Therapie bei Durchfällen unterschiedlicher Ursache. Erkrankungen, bei denen eine Erhöhung der täglichen Ballaststoffaufnahme angestrebt wird, z. B. bei Reizdarmsyndrom, wenn die Obstipation im Vordergrund steht. Zusätzlich Mucofalk® Fit: Unterstützend zu einer Diät bei Hypercholesterinämie. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen Flohsamen oder einen der sonst. Bestandteile, plötzliche Änderung der Stuhlgewohnheit (länger als 2 Wochen), nicht abgeklärte rektale Hämorrhagien, nicht erfolgte Defäkation nach Einnahme eines Abführmittels, Schluckstörungen und andere Hals- und Rachenprobleme, Stenosen des Oesophagus, der Cardia oder im Gastrointestinaltrakt, drohender oder bestehender Darmverschluss (Ileus), Darmlähmung oder Megakolon-Syndrom. Kinder unter 12 Jahren. **Warnhinweise:** Vorsicht bei Kotstau und Beschwerden wie Bauchschmerzen, Übelkeit und Erbrechen; auf reichlich Flüssigkeitszufuhr achten. Eine Einzeldosis enthält 0,5 g Sucrose und 90 mg Natrium. **Nebenwirkungen:** Blähungen und Völlegefühl (klingen normalerweise im Verlauf der Behandlung ab). Bei ungenügender Flüssigkeitszufuhr (mind. 150 ml) können Bauchblähungen und Kotstau auftreten; Gefahr eines Ileus oder einer Oesophagusobstruktion. Überempfindlichkeitsreaktionen nach oraler Einnahme oder durch Hautkontakt, wie Rhinitis, Konjunktivitis, Bronchospasmus, und in einigen Fällen ein anaphylaktischer Schock oder auch Hautreaktionen, wie Exanthem und Pruritus, möglich. **Wechselwirkungen:** siehe Gebrauchsinformation. **Dosierungsanleitung:** Erwachsene und Heranwachsende ab 12 Jahren: 2–6 x tägl. 1 ML bzw. 2–6 x tägl. den Inhalt eines Beutels nach Einrühren in reichlich Flüssigkeit einnehmen. **Packungsgrößen:** 20 Btl., 100 Btl., 150 g Dose, 300 g Dose, Mucofalk® Fit nur in Btl. Stand: 10/2018

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr-falk-pharma.de

M2 6-3/2019 Rau

Mucofalk®

Natürliche Kraft für gute Verdauung



Indikationen Erstattungsfähigkeit Dosierungen Packungsgrößen

Indikationen

- Chronische Obstipation
- Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darmentleerung mit weichem Stuhl angestrebt wird, z. B. bei schmerzhafter Stuhlentleerung nach operativen Eingriffen im Enddarmbereich, Analfissuren, Hämorrhoiden
- unterstützende Therapie bei Diarrhö unterschiedlicher Ursache
- Erkrankungen, bei denen eine Erhöhung der täglichen Ballaststoffaufnahme angestrebt wird, z. B. bei Reizdarmsyndrom, wenn die Obstipation im Vordergrund steht
- unterstützend zu einer Diät bei Hypercholesterinämie (nur Mucofalk® Fit)



Erstattungsfähig*

Zur Behandlung der Obstipation in folgendem Zusammenhang:

- Tumorleiden
- Megacolon
- Divertikulose
- Divertikulitis
- Mucoviszidose
- neurogener Darmlähmung
- bei phosphatbindender Medikation bei chronischer Niereninsuffizienz
- Opiat- sowie Opioidtherapie
- in der Terminalphase

Sowie zur unterstützenden Quellmittelbehandlung bei:

- Morbus Crohn
- Kurzdarmsyndrom
- HIV-assoziierten Diarrhöen

* Arzneimittel-Richtlinie (Stand: 9. November 2018):
Anlage I: **Zugelassene Ausnahmen** zum gesetzl. Verordnungsabschluss nach § 34 Abs. 1 Satz 2 SGBV (OTC-Übersicht)

Dosierungen

Chronische Obstipation und Erkrankungen, bei denen eine erleichterte Darmentleerung mit weichem Stuhl angestrebt wird (z. B. bei schmerzhafter Stuhlentleerung nach operativen Eingriffen im Enddarmbereich, Analfissuren, Hämorrhoiden)
2 – 3x täglich 1 Beutel oder einen gestrichenen Messlöffel unabhängig von den Mahlzeiten einnehmen.

Unterstützende Therapie bei Durchfall oder Reizdarmsyndrom

2 – 6x täglich 1 Beutel oder einen gestrichenen Messlöffel unabhängig von den Mahlzeiten einnehmen.

Unterstützende Behandlung erhöhter Cholesterinwerte (nur Mucofalk® Fit)

2 – 6x täglich 1 Beutel. Die Einnahme wird zu den Mahlzeiten empfohlen.

Mucofalk® und Mucofalk® Fit immer in reichlich Flüssigkeit einrühren (mindestens 150 ml = 1 Glas) und so schnell wie möglich einnehmen. Möglichst ein Glas Flüssigkeit nachtrinken. Zwischen der Einnahme von Mucofalk® bzw. Mucofalk® Fit und anderen Arzneimitteln sollte mindestens ein Abstand von ½ bis 1 Stunde liegen.

Mucofalk® ist für Heranwachsende unter 12 Jahren nicht zugelassen.

Packungsgrößen / PZN

Mucofalk® Apfel Granulat (Beutel)	20 (N1)	04891792
	100 **	04891800
Mucofalk® Apfel Granulat (Dose)	150 g **	04758923
	300 g (N2)	04891823
Mucofalk® Orange Granulat (Beutel)	20 (N1)	04891846
	100 **	04891852
Mucofalk® Orange Granulat (Dose)	150 g **	04684981
	300 g (N2)	04891875
Mucofalk® Fit Granulat (Beutel)	20 (N1)	03062987
	100 **	03062993

Korrekte Rezeptierung von Mucofalk® nach der aktuellen Packungsgrößen-VO (seit 3.7.2013) beachten

** erstattungsfähig auch ohne N-Kennzeichnung, da unter 200 Beuteln (N3) bzw. 300 g Dose (N2)

