

# Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

français

Name des Patienten \_\_\_\_\_

Untersuchung am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

## Lavement intestinal avec Endofalk®


Endofalk® est un mélange de divers sels et de macrogol pour solution buvable à reconstituer, destinée au lavage intensif de l'ensemble de l'intestin en vue d'une coloscopie. Son goût agréable (orange-fruit de la passion ou ananas-citron) facilite la prise. La solution ne contient pas de sucre. Presque aucune absorption ni perte de sel n'a lieu pendant le lavement intestinal, ce qui préserve essentiellement l'équilibre hydrique et électrolytique.

## Préparation de la solution buvable


Le contenu de 2 sachets permet d'obtenir 1 litre de solution buvable. Ne modifiez jamais la posologie prescrit qui est de 2 sachets par litre !



Versez le contenu de 2 sachets dans une carafe ou une bouteille.



Ajoutez-y 1/2 litre d'eau courante **tiède** et laissez dissoudre.



Ajoutez ensuite 1/2 litre d'eau courante **froide**

La solution peut ensuite être conservée au réfrigérateur, car c'est fraîche qu'elle a le meilleur goût. La solution reconstituée doit être bue dans un délai de 48 heures.

## Recommandations

Veillez préparer la solution buvable en respectant la quantité d'Endofalk® qui vous a été prescrite, selon les instructions. 6 sachets d'Endofalk® donnent 3 litres de solution, 8 sachets d'Endofalk® 4 litres de solution.



1 verre toutes les 10 minutes

La solution est à boire par portions de 200–300 ml (environ 1 verre) toutes les 10 minutes, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus ou que l'écoulement rectal soit clair.

Nous recommandons une prise fractionnée de la solution buvable. Commencez par boire la moitié de la solution dans l'après-midi/la soirée précédant l'examen, puis prenez la quantité restante le matin de l'examen.

Il est également possible de boire la totalité de la solution le jour de l'examen si le médecin le demande. La prise se fait alors généralement 4 heures avant que l'examen ne débute.

Veillez ne pas consommer d'aliments solides pendant au moins 2 à 3 heures avant de prendre Endofalk®. Attendez la fin de l'examen avant d'en consommer à nouveau.

Si Endofalk® a été peu efficace chez vous, n'oubliez pas d'en informer le médecin avant l'examen afin qu'il puisse vous administrer un lavement si nécessaire.

Diabétiques : Aucune unité pain (UB).

Femmes prenant la pilule contraceptive : L'effet laxatif peut réduire l'efficacité de la pilule et la rendre insuffisante. Cependant, il faut continuer à la prendre régulièrement.

Patients prenant régulièrement des médicaments : Veuillez informer votre médecin de la prise d'Endofalk®, car le lavement intestinal draine aussi des médicaments qui peuvent être importants et qui n'agissent donc plus efficacement.

Veillez également vous reporter à la notice d'utilisation d'Endofalk® Classic ou d'Endofalk® Tropic.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5  
79108 Freiburg  
Germany

www.dr.falkpharma.de