

Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

Name des Patienten _____

griechisch

Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Καθαριστικό διάλυμα με Endofalk®


Το Endofalk® είναι ένα μίγμα διαφόρων αλάτων με Macrogol για την παρασκευή ενός ισοτονικού διαλύματος, το οποίο πίνεται με σκοπό τον εντατικό καθαρισμό ολόκληρου του εντέρου για την προετοιμασία για εντεροσκόπηση. Η λήψη του διευκολύνεται χάρη στην ευχάριστη γεύση του (άρωμα πορτοκάλι-φρούτα του πάθους ή άρωμα ανανάς-λεμόνι). Το διάλυμα δεν περιέχει ζάχαρη. Κατά τον καθαρισμό του εντέρου δε γίνεται σχεδόν καμιά λήψη ή απώλεια αλάτων, έτσι ώστε το ισοζύγιο ύδατος και ηλεκτρολυτών σας να παραμένει πρακτικά αμετάβλητο.

Παρασκευή του πόσιμου διαλύματος


Το περιεχόμενο από 2 φακελάκια δίνει περίπου 1 λίτρο πόσιμο διάλυμα. Μην αλλάξετε ποτέ την συνιστώμενη δοσολογία που ισοδυναμεί με 2 φακελάκια για κάθε λίτρο!



Αδειάστε το περιεχόμενο από τα 2 φακελάκια σε μια κανάτα ή μια φιάλη.



Προσθέστε 1/2 λίτρο **χλιαρό** νερό από τη βρύση και αφήστε να διαλυθεί.



Προσθέστε ακόμα 1/2 λίτρο **κρύο** νερό από τη βρύση.

Το διάλυμα μπορείτε να το τοποθετήσετε στο ψυγείο, γιατί κρύο έχει καλύτερη γεύση. Το έτοιμο διάλυμα πρέπει να καταναλωθεί εντός 48 ωρών.

Λήψη - Σύσταση

Παρασκευάστε το πόσιμο διάλυμα από τη συνταγογραφημένη ποσότητα φακελών Endofalk® σύμφωνα με τις οδηγίες. 6 φακελάκια Endofalk® δίνουν 3 λίτρα διαλύματος, 8 φακελάκια Endofalk® δίνουν 4 λίτρα διαλύματος.



1 ποτήρι κάθε 10 λεπτά

Το διάλυμα πίνεται σε δόσεις των 200–300 ml (περίπου 1 ποτήρι) ανά 10 λεπτά, μέχρις ότου καταναλωθεί η συνολική ποσότητα ή η έκκριση από τον πρωκτό είναι διαφανής.

Συνιστούμε η λήψη του πόσιμου διαλύματος να γίνει σε πολλές μικρότερες δόσεις. Για αυτό, πιείτε το μισό διάλυμα το απόγευμα/βράδυ πριν από την εξέταση και την υπόλοιπη ποσότητα το πρωί της εξέτασης.

Μετά από σύσταση του γιατρού σας μπορείτε επίσης να πιείτε τη συνολική ποσότητα την ημέρα της εξέτασης. Η λήψη εκτελείται τότε κατά κανόνα περίπου 4 ώρες πριν από την έναρξη της εξέτασης.

Μην καταναλώσετε καμία στερεά τροφή τουλάχιστον 2–3 ώρες πριν από τη λήψη του Endofalk®. Στερεά τροφή μπορείτε να καταναλώσετε πάλι αφού γίνει πρώτα η εξέταση.

Εάν στην περίπτωση σας το Endofalk® δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τότε θα πρέπει να ενημερώσετε οπωσδήποτε τον γιατρό σας, ώστε κατά περίπτωση να λάβετε ένα κλύσμα καθαρισμού.

Διαβητικοί: Το προϊόν δεν αντιστοιχεί σε μονάδες άρτου.

Γυναίκες, που λαμβάνουν αντισυλληπτικά χάπια: Τα καθαριστικά μέτρα μπορεί να οδηγήσουν σε ανεπαρκή δραστηριότητα του αντισυλληπτικού χαπιού. Η λήψη του αντισυλληπτικού χαπιού πρέπει όμως να συνεχιστεί σε κάθε περίπτωση κανονικά.

Ασθενείς που λαμβάνουν τακτικά φάρμακα: Ενημερώστε τον γιατρό σας για τη λήψη του Endofalk®, διότι μέσω της έκπλυσης του εντέρου αποβάλλονται σημαντικά φάρμακα και ως εκ τούτου δεν μπορούν πλέον να δράσουν σωστά.

Επίσης, λάβετε υπόψη το ένθετο της συσκευασίας του Endofalk® Classic ή του Endofalk® Tropic.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr.falkpharma.de