

Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

italienisch

Name des Patienten _____

Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Pulizia intestinale con Endofalk®


Endofalk® è una miscela di diversi sali con macrogol per ottenere una soluzione isotonica bevibile per una pulizia intensa dell'intero intestino in preparazione di una colonscopia. L'assunzione è agevolata dal sapore gradevole (arancia-maracuja o ananas-limone). La soluzione non contiene zuccheri. Durante la pulizia intestinale, l'assorbimento e la perdita di sali sono quasi nulli e l'equilibrio idrico e degli elettroliti nell'organismo resta praticamente inalterato.

Preparazione della soluzione bevibile


Il contenuto di 2 bustine consente di ottenere 1 litro di bevanda pronta al consumo. Non deviare mai dal dosaggio prescritto di 2 bustine per litro!



Versare il contenuto di 2 bustine in una caraffa o in una bottiglia vuote.



Aggiungere ½ litro di acqua corrente **tiepida** e lasciar sciogliere.



Versare un altro ½ litro di acqua corrente **fredda**.

La soluzione può quindi essere posta in frigorifero per un gusto più gradevole e deve essere consumata entro 48 ore.

Raccomandazioni per l'uso

Preparare la soluzione pronta con il numero prescritto di bustine di Endofalk® come indicato qui. 6 bustine di Endofalk® corrispondono a 3 litri di soluzione, 8 bustine di Endofalk® corrispondono a 4 litri di soluzione.



1 bicchiere ogni 10 minuti

La soluzione deve essere consumata in porzioni di 200–300 ml (circa 1 bicchiere) ogni 10 minuti, fino all'esaurimento del prodotto disponibile o finché dal retto non esce che liquido limpido.

Si raccomanda di frazionare l'assunzione della soluzione bevibile: la prima metà nel pomeriggio o la sera del giorno prima dell'esame, e la porzione rimanente al mattino dell'esame.

Su indicazione del medico, l'intera soluzione può essere bevuta anche il giorno dell'esame. In generale, l'assunzione si effettua circa 4 ore prima dell'inizio dell'esame.

Non consumare più alcun cibo solido almeno 2–3 ore prima dell'assunzione di Endofalk®. Sarà possibile farlo nuovamente solo dopo il termine dell'esame.

Se l'effetto di Endofalk® è troppo debole, avvertire obbligatoriamente il medico prima dell'esame, per eseguire eventualmente un clistere evacuativo.

Diabetici: non calcolare alcuna unità di carboidrati.

Donne che assumono anticoncezionali: l'azione lassativa può ridurre l'efficacia della pillola. Non interrompere comunque l'assunzione della pillola.

Pazienti che assumono regolarmente medicinali: informare il medico dell'assunzione di Endofalk® poiché la pulizia intestinale causa l'eliminazione di medicinali importanti, che possono quindi diventare meno efficaci.

Prestare attenzione anche al foglietto illustrativo di Classic o Endofalk® Tropic.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr.falkpharma.de