

Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

polnisch

Name des Patienten _____

Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Oczyszczanie jelit za pomocą Endofalk®


Endofalk® to mieszanka różnych soli z makroglem do sporządzania izotonicznego roztworu do picia, intensywnie oczyszczającego całe jelito w celu przygotowania do kolonoskopii. Delikatny aromat (aromat pomarańczowo-marakujowy lub ananasowo-cytrynowy) ułatwia wypicie. Roztwór nie zawiera cukru. Podczas oczyszczania jelita nie dochodzi prawie w ogóle do przyjęcia lub utraty soli, dzięki czemu zachowany zostaje bilans wody i elektrolitów w organizmie.

Sporządzanie roztworu do picia

Zawartość 2 torebek to 1 litr roztworu do wypicia. Nie zmieniać nigdy podanych proporcji (2 torebki na litr)!



Zawartość 2 torebek wsypać do dzbanka lub butelki.



Wlać 1/2 litra **letniej** wody z kranu i pozostawić do rozpuszczenia.



Dolać kolejne 1/2 litra **zimnej** wody z kranu.

Roztwór można schłodzić w lodówce, bo wtedy smakuje najlepiej. Sporządzony roztwór zużyć w ciągu 48 godzin.

Propozycja dawkowania

Z przepisanej liczby torebek Endofalk® przygotować w powyżej opisany sposób gotowy do wypicia roztwór. Z 6 torebek Endofalk® można otrzymać 3 litry roztworu, a z 8 torebek Endofalk® – 4 litry.



1 szklanka co 10 minut

Roztwór należy pić porcjami po 200–300 ml (to znaczy 1 szklankę) co 10 minut aż do wypicia całości lub do momentu, gdy wyciek z odbytu będzie klarowny.

Zalecamy przyjmowanie roztworu do picia w kilku mniejszych dawkach. Połowę należy wypić popołudniem/wieczorem przed badaniem, a resztę rano w dniu badania.

Jeśli lekarz tak zaleci, można wypić całość roztworu w dniu badania. Należy wtedy rozpocząć picie mniej więcej na 4 godziny przed rozpoczęciem badania.

Na co najmniej 2–3 godziny przed spożyciem Endofalk® nie przyjmować żadnych stałych pokarmów. Stałe pokarmy wolno znów przyjmować dopiero po badaniu.

W przypadku gdy Endofalk® podziałał zbyt łagodnie, należy przed badaniem poinformować o tym lekarza, aby ew. zastosował lewatywę oczyszczającą jelito.

Diabetycy: nie nalicza się jednostek chlebowych.

Kobiety stosujące tabletki antykoncepcyjne: na skutek gruntownego oczyszczenia jelit może dojść do niedostatecznego działania pigułki. Należy jednak dalej regularnie zażywać pigułki.

Pacjenci regularnie zażywający leki: należy poinformować lekarza o zażywaniu Endofalk®, ponieważ wskutek płukania jelit wypłukiwane są ważne leki, które przez to nie mogą już prawidłowo działać.

Należy stosować się również do informacji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania Classic lub Endofalk® Tropic.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr-falk-pharma.de

01/2022