

# Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

Name des Patienten \_\_\_\_\_

serbisch/kroatisch

Untersuchung am \_\_\_\_\_ um \_\_\_\_\_ Uhr

## Čišćenje creva Endofalk-om®


Endofalk® je mešavina različitih soli sa makrogolom od koje se spravlja izotonični rastvor koji se pije u svrhu intenzivnog čišćenja celog creva u pripremi za kolonoskopiju. Prijatan ukus (aroma pomorandže i marakuje ili ananasa i limuna) olakšava uzimanje. Rastvor ne sadrži šećer. Tokom čišćenja creva ne vrši se skoro nikakav unos ili gubitak soli tako da ravnoteža vode i elektrolita ostaje praktički nepromjenjena.

## Priprema rastvora za piće


Sadržaj 2 kesice daje 1 litar rastvora spremnog za piće.  
Nikada ne menjajte propisanu dozu od 2 kesice po litru!



Sadržaj 2 kesice  
sipajte u bokal ili flašu.



Dodajte 1/2 litra **mlake**  
vode iz slavine i pustite  
da se mešavina rastvori.



Dodajte još 1/2 litra **hladne**  
vode iz slavine

Nakon toga, rastvor možete staviti u frižider jer hladan ima najbolji ukus. Rastvor spremjan za upotrebu potrošite u roku od 48 sati.

## Preporuka za uzimanje

Molimo Vas da rastvor spremjan za piće pripremite od propisane količine Endofalk® kesica, kako je navedeno. 6 kesica Endofalk-a® daju 3 litra rastvora, 8 kesica Endofalk-a® daju 4 litra rastvora.



1 čaša za piće svakih 10 minuta

Rastvor se pije u porcijama od 200–300 ml (otprilike 1 čaša za piće) svakih 10 minuta dok se ne potroši čitava količina ili dok rektalni iscedak ne bude bistar.

Preporučujemo da se rastvor za piće uzima u više manjih doza. Popijte polovinu rastvora za piće popodne/uveče pre pregleda, a preostalu količinu ujutru na dan pregleda.

Prema uputstvima lekara, celokupna količina rastvora za piće može se popiti i na dan pregleda. Uzima se obično oko 4 sata pre početka pregleda.

Ne konzumirajte čvrstu hrani najmanje 2–3 sata pre nego što uzmete Endofalk®. Čvrstu hrani smete ponovo da konzumirate tek nakon pregleda.

Ako je Endofalk® delovao preslabo, neophodno je da pre pregleda obavestite lekara kako biste mogli da dobijete klistir za čišćenje ako je potrebno.

Dijabetičari: Ne obračunavaju se jedinice hleba (BE).

Žene koje uzimaju kontraceptivne pilule: Laksativne mere mogu dovesti do nedovoljne efikasnosti pilule. Međutim, važno je da nastavite da redovno uzimate kontraceptivne pilule.

Pacijenti koji redovno uzimaju lekove: Obavestite Vašeg lekara ako uzimate Endofalk® jer ispiranjem creva ispirate važne lekove koji usled toga ne mogu da imaju pravo dejstvo.

Takođe obratite pažnju na dodatak ambalaži Classic ili Endofalk® Tropic sredstva.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5  
79108 Freiburg  
Germany

www.drfalkpharma.de