

Die Darmreinigung mit Endofalk® – Hinweise für den Patienten

türkisch

Name des Patienten _____

Untersuchung am _____ um _____ Uhr

Endofalk® ile bağırsak temizliği


Endofalk® Macrogol ile çeşitli tuzların karışımıdır ve kolonoskopiye hazırlık için bağırsakları iyice temizlemek amacıyla içilen izotonik bir çözeltinin hazırlanmasında kullanılır. Aroma katmak (portakal-çarkıfelek meyvesi aroması ya da ananas-limon aroması) içimini kolaylaştırır. Çözelti şeker içermemektedir. Bağırsak temizlenmesi esnasında neredeyse hiç tuz alımı veya tuz kaybı olmaz, böylece su ve elektrolit durumunuz değişikliğe uğramaz.

İçilecek Çözeltinin Hazırlanması


2 poşetin içeriği ile 1 litre içime hazır çözelti elde edilir. Litre başına 2 poşet ölçüsünü kesinlikle değiştirmeyin!



2 poşet içeriğini bir sürahi veya şişe içine doldurun.



Ayrıca 1/2 litre **ılık** musluk suyu ilave edin ve eritin.



1/2 litre daha **soğuk** musluk suyu ilave edin.

Ardından, çözeltinin tadı soğutulduğunda daha iyi olduğu için buzdolabına koyulabilir. Kullanıma hazır haldeki çözelti 48 saat içerisinde tüketilmelidir.

Alım Önerileri

İçime hazır çözeltiyi lütfen belirtildiği gibi Endofalk® poşetlerinden ve size reçete edilen miktarda hazırlayın. 6 poşet Endofalk® ile 3 litre, 8 poşet Endofalk® ile 4 litre çözelti hazırlanabilir.



10 dakikada 1 bardak

Çözelti, 10 dakikada bir olarak 200-300 ml'lik (yaklaşık 1 bardak) porsiyonlar halinde, hepsi bitene veya rektal akıntı berrak gelene kadar içilecektir.

İçme çözeltisini birkaç küçük dozda almanızı öneririz. Çözeltinin yarısını muayene gününden önceki akşamüstü/akşam, geri kalan miktarı ise muayene sabahı için.

Doktor tavsiyesine bağlı olarak, çözeltinin tamamı muayene günü içilebilir. Genellikle, muayene başlamadan yaklaşık 4 saat önce içilir.

Endofalk içmeden önceki en az 2-3 saat boyunca® katı besin tüketmeyin. Muayene bitene kadar katı besin tüketmeyin.

Endofalk® sizde yeterli düzeyde etkili olmadıysa, gerekirse bir lavman alabilmeniz için muayeneden önce doktorunuzu mutlaka bilgilendirin.

Diyabetliler: Karbonhidrat (KH) artışına neden olmaz.

Doğum kontrol hapı kullanan kadınlar: İshal önlemleri, hapin yetersiz ölçüde etki etmesine yol açabilir. Ancak, doğum kontrol hapları almaya mutlaka düzenli bir şekilde devam edilmelidir.

Düzenli ilaç kullanan hastalar: Lütfen hekiminizi Endofalk® alımınız hakkında bilgilendiriniz, çünkü bağırsak temizlenmesi sırasında önemli ilaçlar dışarı atılır ve bu nedenle gerektiği gibi etki göstermeyebilirler.

Lütfen Classic veya Endofalk® Tropic için prospektüse de bakın.

DR. FALK PHARMA GmbH



Leinenweberstr. 5
79108 Freiburg
Germany

www.dr.falkpharma.de

01/2022